



練物をより歯応え良く

# プロテアタック

練物

# 酵素の力で

# プロテアタック

～トランスグルタミナーゼ製剤～

シソノズ

さらに

# 美味しく

食肉加工品をよりジューシーに

# プロテアタック

結着粉まぶし



株式会社 フードケアリ

☎ 022-788-4410

〒983-0034 仙台市宮城野区扇町1丁目8-37

Fax●022-232-2044  フードケアリ | 検索

販売代理店


# プロテアタック各種 ご使用例

## プロテアタック **練物**

### 蒲鉾の弾力アップフロー ◎魚肉すり身への添加量/0.05~0.2%



### タラコ・明太子のプチプチ感増強フロー ◎タラコ原卵への添加量/0.05~0.5%



#### 製品情報

食品への  
添加物表示例

【酵素が失活している場合】調味料(有機酸)  
【酵素が失活していない場合】調味料(有機酸)、酵素  
※JASその他法規に定めのある場合は法規に従って表示ください。

アレルギー  
表示

なし

## プロテアタック **結着粉まぶし**

### 畜肉・魚肉結着フロー ◎原料肉への添加量/0.5~1.5%



#### 製品情報

食品への  
添加物表示例

【酵素が失活している場合】該当する添加物無し  
【酵素が失活していない場合】酵素  
※JASその他法規に定めのある場合は法規に従って表示ください。

アレルギー  
表示

乳成分

#### ■内容成分

トランスグルタミナーゼ	5.00%
ポリリン酸ナトリウム	2.50%
ピロリン酸四ナトリウム(無水)	2.50%
乳たん白	50.00%
乳糖	20.00%
デキストリン	20.00%

# プロテアタック共通 製品情報

### 荷姿

1kg袋×10個/ダンボール入り

### 保存方法

冷凍(-15℃以下)。開封後は脱気密封し冷凍保管の上、なるべく早めにご使用ください。

### 使用上のご注意

●飛散をさせて直接目や皮膚に触れないようにしてください。●必要に応じて手袋、防塵マスク、防塵眼鏡等を着用ください。●吸引、接触によりアレルギー反応、喘息発作を起こすことがあります。●目や皮膚にふれ異常を感じた場合は水で洗い流してください。●症状が激しい場合は、医師の診断を受けてください。

